

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE \_\_\_\_\_

FICHE CONSEIL N° **7.04**

Rubrique : Les choix esthétiques

## Greffe gingivale à visée esthétique

Différents défauts esthétiques de la cavité buccale peuvent être traités à l'aide de greffes de gencive. La greffe consiste, sous anesthésie locale, à prélever un morceau de gencive à un endroit de la bouche (le plus souvent au palais) pour aller le greffer à un autre endroit.

### Greffe gingivale et recouvrement d'une récession de la gencive.

Certaines récessions de la gencive sont traitées en recouvrant la dénudation de la racine dentaire par un greffon gingival. L'intervention se déroule de la façon suivante :



Avant la greffe



Réalisation de la greffe



Après cicatrisation

Au bout d'une dizaine de jours, la cicatrisation est déjà bien avancée. Quelques semaines, voire quelques mois, sont parfois nécessaires pour obtenir une cicatrisation complète et un résultat esthétique définitif. En fonction du cas, la récession de la gencive peut être recouverte totalement ou partiellement.

### Greffe gingivale et comblement d'un déficit de volume au niveau d'une crête édentée.

L'extraction d'une dent entraîne souvent une diminution du volume de la gencive et de l'os à ce niveau. Lors du remplacement ultérieur de la dent par un bridge ou un implant, si la perte de volume de ces tissus n'est pas compensée, le résultat esthétique est souvent décevant. Ce problème peut être résolu en greffant un peu de gencive dans la zone concernée.

Cette intervention permet d'obtenir un résultat esthétique satisfaisant. Elle est principalement réalisée dans les zones très visibles de la bouche et en particulier au niveau des dents antérieures.

#### Nos Conseils

- L'hygiène de la zone où la greffe est réalisée est très importante pour obtenir un résultat esthétique optimal. Les bains de bouche prescrits après l'intervention doivent donc être réalisés avec le plus grand soin.
- Le tabac réduit le succès des greffes gingivales.
- Pour un meilleur résultat, l'arrêt ou la diminution de votre consommation de tabac pendant les quelques jours ou quelques semaines qui précèdent et qui suivent l'intervention ne peuvent être que bénéfiques pour le résultat esthétique final.

Une hygiène rigoureuse et l'arrêt temporaire du tabac conditionnent le succès du traitement